

# Modern Quantum Mechanics (Sakurai and Napolitano)

使用しているのは second edition. 演習問題はサボった。そのうちやる w

## Chapter1

# Fundamental Concepts

■(1.7.20)  $\langle x' | p^n | \alpha \rangle = (-i\hbar)^n \nabla'^n \langle x' | \alpha \rangle$  は大事

## Chapter3

# Theory of Angular Momentum

■(3.11.19), (3.11.23) (3.5.49)

**■角運動量の合成** 2種類の角運動量  $\mathbf{J}_1, \mathbf{J}_2$  を考える。 $\mathbf{J} = \mathbf{J}_1 \otimes 1 + 1 \otimes \mathbf{J}_2$  とする。このとき、2種類の同時固有函数を考える。すなわち

ef 1.  $\mathbf{J}_1^2, \mathbf{J}_2^2, J_{1z}, J_{2z}$  の同時固有函数  $|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle$  :

$$\begin{aligned} (\mathbf{J}_1^2 \otimes 1) |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle &= j_1(j_1 + 1) |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle, \\ (1 \otimes \mathbf{J}_2^2) |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle &= j_2(j_2 + 1) |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle, \\ (J_{1z} \otimes 1) |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle &= m_1 |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle, \\ (1 \otimes J_{2z}) |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle &= m_2 |j_1 j_2; m_1 m_2\rangle. \end{aligned} \quad [3.1]$$

ef 2.  $\mathbf{J}_1^2, \mathbf{J}_2^2, \mathbf{J}^2, J_z$  の同時固有函数  $|j_1 j_2; jm\rangle$  :

$$\begin{aligned} (\mathbf{J}_1^2 \otimes 1) |j_1 j_2; jm\rangle &= j_1(j_1 + 1) |j_1 j_2; jm\rangle, \\ (1 \otimes \mathbf{J}_2^2) |j_1 j_2; jm\rangle &= j_2(j_2 + 1) |j_1 j_2; jm\rangle, \\ \mathbf{J}^2 |j_1 j_2; jm\rangle &= j(j + 1) |j_1 j_2; jm\rangle, \\ J_z |j_1 j_2; jm\rangle &= m |j_1 j_2; jm\rangle. \end{aligned} \quad [3.2]$$

同時固有函数 ef 1. は容易に構成できる。すなわち、 $\mathbf{J}_1^2, J_{1z}$  の同時固有函数  $|j_1 m_1\rangle$  :

$$\mathbf{J}_1^2 |j_1 m_1\rangle = j_1(j_1 + 1) |j_1 m_1\rangle, \quad [3.3]$$

$$J_{1z} |j_1 m_1\rangle = m_1 |j_1 m_1\rangle \quad [3.4]$$

及び  $\mathbf{J}_2^2, J_{2z}$  の同時固有函数  $|j_2 m_2\rangle$  :

$$\mathbf{J}_2^2 |j_2 m_2\rangle = j_2(j_2 + 1) |j_2 m_2\rangle, \quad [3.5]$$

$$J_{2z} |j_2 m_2\rangle = m_2 |j_2 m_2\rangle \quad [3.6]$$

が与えられていれば、

$$|j_1 j_2; m_1 m_2\rangle = |j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle \quad [3.7]$$

とすればよい。

$j_1, j_2$  を固定する (これによって部分空間が得られる).  $|j_1j_2; m_1m_2\rangle, |j_1j_2; jm\rangle$  はこの部分空間の基底となるので,

$$\sum_{m_1} \sum_{m_2} |j_1j_2; m_1m_2\rangle \langle j_1j_2; m_1m_2| = 1. \quad [3.8]$$

従って,

$$|j_1j_2; jm\rangle = \sum_{m_1} \sum_{m_2} |j_1j_2; m_1m_2\rangle \langle j_1j_2; m_1m_2| |j_1j_2; jm\rangle \quad [3.9]$$

が成立する.

**追加定義 3.10.**  $\langle j_1j_2; m_1m_2 | j_1j_2; jm \rangle$  を Clebsch-Gordan 係数と呼ぶ.

**追加定理 3.11.** Clebsch-Gordan 係数  $\langle j_1j_2; m_1m_2 | j_1j_2; jm \rangle$  は  $m = m_1 + m_2$  でない限り 0 となる.

例えば, 電子の軌道角運動量とスピン角運動量の場合は  $j_1 = l, j_2 = 1/2$ . 全角運動量の大きさが  $j = l+1/2$  で, その  $z$  成分が  $m$  の函数を展開してみる. Clebsch-Gordan 係数が非零なのは  $(m_1, m_2) = (m \mp 1/2, \pm 1/2)$  の場合のみなので,  $(j_1j_2;$  は省略して)

$$\left| l + \frac{1}{2}, m \right\rangle = \left| m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle \left\langle m - \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \middle| l + \frac{1}{2}, m \right\rangle + \left| m + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle \left\langle m + \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \middle| l + \frac{1}{2}, m \right\rangle. \quad [3.12]$$

## ■2 電子系

**1 電子のスピン** まず, 1 電子のスピンについて考える. スピンの  $z$  成分  $s_z$  の固有函数を  $|+\rangle, |-\rangle$  とする:

$$s_z |+\rangle = \frac{1}{2} |+\rangle, \quad s_z |-\rangle = -\frac{1}{2} |-\rangle.$$

固有函数の性質から

$$\langle +|+ \rangle = \langle -|- \rangle = 1, \quad \langle +|- \rangle = \langle -|+ \rangle = 0, \quad |+\rangle \langle +| + |-\rangle \langle -| = 1.$$

$s_x, s_y, s_z$  は次のように書ける:

$$\begin{aligned} s_x &= \frac{1}{2} (|+\rangle \langle -| + |-\rangle \langle +|), \\ s_y &= \frac{i}{2} (|-\rangle \langle +| - |+\rangle \langle -|), \\ s_z &= \frac{1}{2} (|+\rangle \langle +| - |-\rangle \langle -|). \end{aligned}$$

さらに,

$$s_+ = s_x + is_y = |+\rangle \langle -|, \quad s_- = s_x - is_y = |-\rangle \langle +|$$

とすれば,

$$s_+ |+\rangle = s_- |-\rangle = 0, \quad s_- |+\rangle = |-\rangle, \quad s_+ |-\rangle = |+\rangle.$$

**2 電子のスピン** 2電子のスピンを  $s_1, s_2$  で表す。合成スピンを

$$\mathbf{s} = \mathbf{s}_1 \otimes \mathbf{1} + \mathbf{s}_2 \otimes \mathbf{1}$$

とする。合成スピンの  $z$  成分は

$$s_z = s_{1z} \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes s_{2z}$$

で与えられ、その大きさは

$$\begin{aligned} \mathbf{s}^2 &= {s_{1x}}^2 \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes {s_{2x}}^2 + 2s_{1x} \otimes s_{2x} + \dots \\ &= \mathbf{s}_1^2 \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes \mathbf{s}_2^2 + 2s_{1z} \otimes s_{2z} + s_{1+} \otimes s_{2-} + s_{1-} \otimes s_{2+} \end{aligned}$$

となる。

$\mathbf{s}^2, s_z$  の同時固有函数が Clebsch-Gordan 係数を使って求まるが、それの検算をしてみる。

$|+\rangle \otimes |+\rangle$ .

$$\begin{aligned} s_z(|+\rangle \otimes |+\rangle) &= (s_{1z} \otimes \mathbf{1})(|+\rangle \otimes |+\rangle) + (\mathbf{1} \otimes s_{2z})(|+\rangle \otimes |+\rangle) \\ &= |+\rangle \otimes |+\rangle \end{aligned}$$

なので、合成スピンの  $z$  成分は 1.

$$\begin{aligned} \mathbf{s}^2(|+\rangle \otimes |+\rangle) &= (\mathbf{s}_1^2 \otimes \mathbf{1})(|+\rangle \otimes |+\rangle) + (\mathbf{1} \otimes \mathbf{s}_2^2)(|+\rangle \otimes |+\rangle) + 2(s_{1z} \otimes s_{2z})(|+\rangle \otimes |+\rangle) \\ &\quad + (s_{1+} \otimes s_{2-})(|+\rangle \otimes |+\rangle) + s_{1-} \otimes s_{2+}(|+\rangle \otimes |+\rangle) \\ &= \frac{3}{4}(|+\rangle \otimes |+\rangle) + \frac{3}{4}(|+\rangle \otimes |+\rangle) + \frac{1}{2}(|+\rangle \otimes |+\rangle) \\ &= 2(|+\rangle \otimes |+\rangle) \end{aligned}$$

なので、スピンの大きさは  $2 = 1(1+1)$ .

$|-\rangle \otimes |-\rangle$ .

$$\begin{aligned} s_z(|-\rangle \otimes |-\rangle) &= (s_{1z} \otimes \mathbf{1})(|-\rangle \otimes |-\rangle) + (\mathbf{1} \otimes s_{2z})(|-\rangle \otimes |-\rangle) \\ &= -|-\rangle \otimes |-\rangle \end{aligned}$$

なので、合成スpinの  $z$  成分は  $-1$ .

$$\begin{aligned} \mathbf{s}^2(|-\rangle \otimes |-\rangle) &= (\mathbf{s}_1^2 \otimes \mathbf{1})(|-\rangle \otimes |-\rangle) + (\mathbf{1} \otimes \mathbf{s}_2^2)(|-\rangle \otimes |-\rangle) + 2(s_{1z} \otimes s_{2z})(|-\rangle \otimes |-\rangle) \\ &\quad + (s_{1+} \otimes s_{2-})(|-\rangle \otimes |-\rangle) + s_{1-} \otimes s_{2+}(|-\rangle \otimes |-\rangle) \\ &= \frac{3}{4}(|-\rangle \otimes |-\rangle) + \frac{3}{4}(|-\rangle \otimes |-\rangle) + \frac{1}{2}(|-\rangle \otimes |-\rangle) \\ &= 2(|-\rangle \otimes |-\rangle) \end{aligned}$$

なので、スpinの大きさは  $2 = 1(1+1)$ .

$|+\rangle \otimes |-\rangle$ .

$$\begin{aligned} s_z(|+\rangle \otimes |-\rangle) &= (s_{1z} \otimes \mathbf{1})(|+\rangle \otimes |-\rangle) + (\mathbf{1} \otimes s_{2z})(|+\rangle \otimes |-\rangle) \\ &= 0 \end{aligned}$$

なので、合成スpinの  $z$  成分は 0.

$$\mathbf{s}^2(|+\rangle \otimes |-\rangle) = (\mathbf{s}_1^2 \otimes \mathbf{1})(|+\rangle \otimes |-\rangle) + (\mathbf{1} \otimes \mathbf{s}_2^2)(|+\rangle \otimes |-\rangle) + 2(s_{1z} \otimes s_{2z})(|+\rangle \otimes |-\rangle)$$

$$\begin{aligned}
& + (s_{1+} \otimes s_{2-})(|+\rangle \otimes |-\rangle) + s_{1-} \otimes s_{2+}(|+\rangle \otimes |-\rangle) \\
& = \frac{3}{4}(|+\rangle \otimes |-\rangle) + \frac{3}{4}(|+\rangle \otimes |-\rangle) - \frac{1}{2}(|+\rangle \otimes |-\rangle) + |-\rangle \otimes |+\rangle \\
& = |+\rangle \otimes |-\rangle + |-\rangle \otimes |+\rangle.
\end{aligned}$$

$|-\rangle \otimes |+\rangle$ .

$$\begin{aligned}
s_z(|-\rangle \otimes |+\rangle) &= (s_{1z} \otimes 1)(|-\rangle \otimes |+\rangle) + (1 \otimes s_{2z})(|-\rangle \otimes |+\rangle) \\
&= 0
\end{aligned}$$

なので、合成スピンの  $z$  成分は 0.

$$\begin{aligned}
s^2(|-\rangle \otimes |+\rangle) &= (s_1^2 \otimes 1)(|-\rangle \otimes |+\rangle) + (1 \otimes s_2^2)(|-\rangle \otimes |+\rangle) + 2(s_{1z} \otimes s_{2z})(|-\rangle \otimes |+\rangle) \\
&\quad + (s_{1+} \otimes s_{2-})(|-\rangle \otimes |+\rangle) + s_{1-} \otimes s_{2+}(|-\rangle \otimes |+\rangle) \\
&= \frac{3}{4}(|-\rangle \otimes |+\rangle) + \frac{3}{4}(|-\rangle \otimes |+\rangle) - \frac{1}{2}(|-\rangle \otimes |+\rangle) + |+\rangle \otimes |-\rangle \\
&= |-\rangle \otimes |+\rangle + |+\rangle \otimes |-\rangle.
\end{aligned}$$

後半 2 つは  $s^2$  の固有函数ではないので、これらの線形結合を考える。

$$\begin{aligned}
s_z \frac{|+\rangle \otimes |-\rangle + |-\rangle \otimes |+\rangle}{\sqrt{2}} &= 0, \\
s^2 \frac{|+\rangle \otimes |-\rangle + |-\rangle \otimes |+\rangle}{\sqrt{2}} &= 2 \frac{|+\rangle \otimes |-\rangle + |-\rangle \otimes |+\rangle}{\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

なので、 $(|+\rangle \otimes |-\rangle + |-\rangle \otimes |+\rangle)/\sqrt{2}$  はスピンの大きさが  $2 = 1(1+1)$ .

$$\begin{aligned}
s_z \frac{|+\rangle \otimes |-\rangle - |-\rangle \otimes |+\rangle}{\sqrt{2}} &= 0, \\
s^2 \frac{|+\rangle \otimes |-\rangle - |-\rangle \otimes |+\rangle}{\sqrt{2}} &= 0
\end{aligned}$$

なので、 $(|+\rangle \otimes |-\rangle - |-\rangle \otimes |+\rangle)/\sqrt{2}$  はスピンの大きさが  $0 = 0(0+1)$ .

$\sqrt{2}$  は規格化定数。実際,

$$\begin{aligned}
& (\langle +| \otimes \langle -| + \langle -| \otimes \langle +|)(|+\rangle \otimes |-\rangle + |-\rangle \otimes |+\rangle) \\
& = \langle +| + \rangle \otimes \langle -| - \rangle + \langle -| - \rangle \otimes \langle +| + \rangle \\
& = 2.
\end{aligned}$$

■(3.2.47) 単位ベクトル  $\mathbf{n}$  の周りに  $\phi$  だけ回転する時、スピノル  $\chi$  は

$$\chi \rightarrow \exp\left(-\frac{i\sigma \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right)\chi \quad [3.13]$$

と変化する。この時、 $\chi^\dagger \sigma_k \chi$  は

$$\chi^\dagger \sigma_k \chi \rightarrow \chi^\dagger \exp\left(\frac{i\sigma \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_k \exp\left(-\frac{i\sigma \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \chi$$

となる。ここで出てきた

$$\exp\left(\frac{i\sigma \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_k \exp\left(-\frac{i\sigma \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \quad [3.14]$$

を計算する.  $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$  は Pauli 行列で

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad [3.15]$$

で与えられる. 指数関数の部分は Taylor 展開され,  $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n})^2 = 1$  などを使うと,

$$\exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) = \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -(in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \quad [3.16]$$

となる. また, 3次元で  $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$  の周りの  $\phi$  の回転は次の行列:

$$R = \begin{pmatrix} \cos\phi + n_x^2(1 - \cos\phi) & n_x n_y(1 - \cos\phi) - n_z \sin\phi & n_z n_x(1 - \cos\phi) + n_y \sin\phi \\ n_x n_y(1 - \cos\phi) + n_z \sin\phi & \cos\phi + n_y^2(1 - \cos\phi) & n_y n_z(1 - \cos\phi) - n_x \sin\phi \\ n_z n_x(1 - \cos\phi) - n_y \sin\phi & n_y n_z(1 - \cos\phi) + n_x \sin\phi & \cos\phi + n_z^2(1 - \cos\phi) \end{pmatrix} \quad [3.17]$$

で与えられる.

まずは  $\sigma_1$  の計算から. [3.15][3.16] から

$$\begin{aligned} & \exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_1 \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \\ &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (in_x - n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\quad \times \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -(in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (in_x - n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -(in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^* & -A_{11} \end{pmatrix}. \end{aligned} \quad [3.18]$$

成分を計算すれば,

$$\begin{aligned} A_{11} &= \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] (-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) + (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] \\ &= n_y \sin\phi + n_z n_x(1 - \cos\phi), \\ A_{12} &= \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right]^2 - (in_x + n_y)^2 \sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ &= \cos\phi + n_x^2(1 - \cos\phi) - in_x n_y(1 - \cos\phi) + in_z \sin\phi. \end{aligned} \quad [3.19]$$

ところで, [3.15][3.16][3.17][3.19] から

$$R_{11}\sigma_1 + R_{12}\sigma_2 + R_{13}\sigma_3 = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^* & -A_{11} \end{pmatrix} \quad [3.20]$$

となる. [3.18][3.20] から

$$\exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_1 \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) = \sum_l R_{1l} \sigma_l. \quad [3.21]$$

次に  $\sigma_2$  の計算. [3.15][3.16] から

$$\begin{aligned}
& \exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_2 \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \\
&= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (in_x - n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ i & 0 \end{pmatrix} \\
&\quad \times \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -(in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (in_x - n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\
&\quad \times \begin{pmatrix} (-n_x - in_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -i \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + n_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ i \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + n_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -(-n_x - in_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{12}^* & -B_{11} \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{3.22}$$

成分を計算すれば,

$$\begin{aligned}
B_{11} &= \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] (-n_x - in_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) + (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \left[ i \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + n_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] \\
&= n_y n_z (1 - \cos \phi) - n_x \sin \phi, \\
B_{12} &= \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] \left[ -i \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + n_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] \\
&\quad - (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) (-n_x - in_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\
&= n_x n_y (1 - \cos \phi) + n_z \sin \phi - i \cos \phi - in_y^2 (1 - \cos \phi).
\end{aligned} \tag{3.23}$$

ところで, [3.15][3.16][3.17][3.23] から

$$R_{21}\sigma_1 + R_{22}\sigma_2 + R_{23}\sigma_3 = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{12}^* & -B_{11} \end{pmatrix} \tag{3.24}$$

となる. [3.22][3.24] から

$$\exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_2 \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) = \sum_l R_{2l} \sigma_l. \tag{3.25}$$

最後に  $\sigma_3$  の計算. [3.15][3.16] から

$$\begin{aligned}
& \exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_3 \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \\
&= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (in_x - n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\
&\quad \times \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -(in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ (in_x - n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\
&\quad \times \begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -(in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\ -(-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) & -\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12}^* & -C_{11} \end{pmatrix}.
\end{aligned} \tag{3.26}$$

成分を計算すれば,

$$\begin{aligned}
C_{11} &= \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] - (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) (-in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\
&= \cos\phi + n_z^2(1 - \cos\phi), \\
C_{12} &= - \left[ \cos\left(\frac{\phi}{2}\right) + in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \\
&\quad + (in_x + n_y) \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \left[ -\cos\left(\frac{\phi}{2}\right) - in_z \sin\left(\frac{\phi}{2}\right) \right] \\
&= n_z n_x (1 - \cos\phi) n_y \sin\phi - in_y n_z (1 - \cos\phi) - in_x \sin\phi.
\end{aligned} \tag{3.27}$$

ところで, [3.15][3.16][3.17][3.27] から

$$R_{31}\sigma_1 + R_{32}\sigma_2 + R_{33}\sigma_3 = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12}^* & -C_{11} \end{pmatrix} \tag{3.28}$$

となる. [3.26][3.28] から

$$\exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_3 \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) = \sum_l R_{3l} \sigma_l. \tag{3.29}$$

[3.21][3.25][3.29] から

$$\exp\left(\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) \sigma_k \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}\phi}{2}\right) = \sum_l R_{kl} \sigma_l.$$

## Chapter4

# Symmetry in Quantum Mechanics

### ■変換とか

定義 ケットに対する微小変換を

$$|\psi'\rangle = U(\epsilon) |\psi\rangle$$

と定義する。 $U$ はユニタリ演算子（下の計算でノルムを考えれば直ちに分かる）。

$$\langle\psi| A |\psi\rangle \rightarrow \langle\psi'| A |\psi'\rangle = \langle\psi| U^\dagger AU |\psi\rangle = \langle\psi| U^{-1}AU |\psi\rangle$$

なので、微小変換によって、**演算子**が

$$A \rightarrow U^{-1}AU$$

に変化するとも考えることができる。微小変換 $U(\epsilon)$ を

$$U(\epsilon) = 1 - i\epsilon T$$

と書く。ユニタリ演算子 $T$ を**生成子**と呼ぶ。

$$\delta A = U^{-1}AU - A = i\epsilon[T, A]$$

となる。これを生成子の定義とすることもある。

空間並進  $t$ の向きに $\epsilon$ 進む空間並進を考える。これにより、 $\delta x^\nu = \epsilon^\nu$ となる。この変換の生成子は $t \cdot P$ 。  
実際,

$$i\epsilon[t^\mu P^\mu, X^\nu] = \epsilon t^\mu \delta^{\mu\nu} = \epsilon t^\nu = \delta x^\nu.$$

空間回転  $n$ を軸として $\epsilon$ 回る回転を考える。これにより、 $\delta x^\nu = \epsilon(n \times X)^\nu$ となる。この変換の生成子は $n \cdot L$ 。  
実際

$$\begin{aligned} i\epsilon[n^\mu L^\mu, X^\nu] &= i\epsilon n^\mu [\epsilon^{\mu\rho\sigma} X^\rho P^\sigma, X^\nu] = i\epsilon n^\mu \epsilon^{\mu\rho\sigma} X^\rho [P^\sigma, X^\nu] = \epsilon n^\mu \epsilon^{\mu\rho\sigma} X^\rho \delta^{\sigma\nu} = \epsilon n^\mu \epsilon^{\mu\rho\nu} X^\rho = \epsilon(n \times X)^\nu \\ &= \delta x^\nu. \end{aligned}$$

時間並進 時刻が $\epsilon$ 経過する変換を考える。これについては、生成子は $H$ 。  
実際、 $\psi(t + \epsilon) = \psi(t) - i\epsilon H \psi(t)$ 。

## Chapter5

# Approximation Methods

■(5.2.13) 解くべき摂動方程式は

$$(H_0 + \lambda V) |l\rangle = E |l\rangle.$$

$|l\rangle$  の摂動展開は

$$|l\rangle = |l^{(0)}\rangle + \lambda |l^{(1)}\rangle + \dots$$

で  $E$  の摂動展開は

$$E = E_D^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \dots$$

とする。非摂動状態 ( $\lambda = 0$ ) でエネルギー固有値  $E_D^{(0)}$  に属する状態を  $|m^{(0)}\rangle$  ( $m = 0, 1, \dots$ ) とする：

$$H_0 |m^{(0)}\rangle = E_D^{(0)} |m^{(0)}\rangle.$$

$|l\rangle$  は  $\lambda \rightarrow 0$  で  $|l^{(0)}\rangle$  になり、エネルギーが  $E_D^{(0)}$  になるので、 $|l^{(0)}\rangle$  は  $|m^{(0)}\rangle$  の線形結合となる：

$$|l^{(0)}\rangle = \sum_{m \in D} \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle |m^{(0)}\rangle.$$

摂動をあらわに書けば

$$(H_0 + \lambda V)(|l^{(0)}\rangle + \lambda |l^{(1)}\rangle + \dots) = (E_D^{(0)} + \lambda E^{(1)} + \dots)(|l^{(0)}\rangle + \lambda |l^{(1)}\rangle + \dots).$$

まずは  $\lambda$  の係数を比較して、

$$V |l^{(0)}\rangle + H_0 |l^{(1)}\rangle = E_D^{(0)} |l^{(1)}\rangle + E^{(1)} |l^{(0)}\rangle.$$

$|l^{(0)}\rangle$  を展開して、

$$\sum_{m \in D} \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle V |m^{(0)}\rangle + H_0 |l^{(1)}\rangle = E_D^{(0)} |l^{(1)}\rangle + E^{(1)} \sum_{m \in D} \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle |m^{(0)}\rangle.$$

両辺に  $\langle m'^{(0)} |$  をかけて、

$$\sum_{m \in D} \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle \langle m'^{(0)} | V |m^{(0)}\rangle + \langle m'^{(0)} | H_0 |l^{(1)}\rangle = E_D^{(0)} \langle m'^{(0)} | l^{(1)} \rangle + E^{(1)} \sum_{m \in D} \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle \langle m'^{(0)} | m^{(0)}\rangle.$$

$\langle m'^{(0)} | m^{(0)} \rangle = \delta_{mm'}$  なので

$$\sum_{m \in D} V_{m'm} \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle + E_D^{(0)} \langle m'^{(0)} | l^{(1)} \rangle = E_D^{(0)} \langle m'^{(0)} | l^{(1)} \rangle + E^{(1)} \langle m'^{(0)} | l^{(0)} \rangle.$$

従つて,

$$\sum_{m \in D} V_{m'm} \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle = E^{(1)} \langle m'^{(0)} | l^{(0)} \rangle.$$

あらわに書けば,

$$\begin{pmatrix} V_{11} & V_{12} & \cdots \\ V_{21} & V_{22} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle 1^{(0)} | l^{(0)} \rangle \\ \langle 2^{(0)} | l^{(0)} \rangle \\ \vdots \\ \langle g^{(0)} | l^{(0)} \rangle \end{pmatrix} = E^{(1)} \begin{pmatrix} \langle 1^{(0)} | l^{(0)} \rangle \\ \langle 2^{(0)} | l^{(0)} \rangle \\ \vdots \\ \langle g^{(0)} | l^{(0)} \rangle \end{pmatrix}$$

となる。

$$\sum_{m \in D} \langle m'^{(0)} | V | m^{(0)} \rangle \langle m^{(0)} | l^{(0)} \rangle = E^{(1)} \langle m'^{(0)} | l^{(0)} \rangle$$

だが、 $P_0 = \sum_{m \in D} |m^{(0)}\rangle \langle m^{(0)}|$  なので、

$$\langle m'^{(0)} | VP_0 | l^{(0)} \rangle = E^{(1)} \langle m'^{(0)} | l^{(0)} \rangle.$$

両辺に  $|m'^{(0)}\rangle$  をかけて  $m' \in D$  で和をとると、

$$\sum_{m' \in D} |m'^{(0)}\rangle \langle m'^{(0)} | VP_0 | l^{(0)} \rangle = E^{(1)} \sum_{m' \in D} |m'^{(0)}\rangle \langle m'^{(0)} | l^{(0)} \rangle.$$

従つて

$$P_0 VP_0 P_0 |l^{(0)}\rangle = E^{(1)} P_0 |l^{(0)}\rangle.$$

これは  $P_0 VP_0$  の固有値問題となっている。従つて、重解を含めて  $g$  個の固有ベクトル  $P_0 |l_i^{(0)}\rangle$  とエネルギー固有値  $v_i$  が存在する：

$$P_0 VP_0 P_0 |l_i^{(0)}\rangle = v_i P_0 |l_i^{(0)}\rangle.$$

容易に分かるように、 $|l_i^{(0)}\rangle$  は正規直交系をなす： $\langle l_i^{(0)} | l_j^{(0)} \rangle = \delta_{ij}$ 。よって、

$$(H_0 + \lambda P_0 VP_0) P_0 |l_i^{(0)}\rangle = (E_D^{(0)} + \lambda v_i) P_0 |l_i^{(0)}\rangle.$$

(5.2.3) から

$$(E_i - E_D^{(0)} - \lambda P_0 VP_0) P_0 |l_i\rangle = \lambda P_0 VP_1 |l_i\rangle$$

なので、 $E_i = E_D^{(0)} + \lambda v_i + \lambda^2 \Delta_i^{(2)} + \dots$  として、

$$(\lambda v_i + \lambda^2 \Delta_i^{(2)} + \dots - \lambda P_0 VP_0)(P_0 |l_i^{(0)}\rangle + \lambda P_0 |l_i^{(1)}\rangle + \dots) = \lambda P_0 V(P_0 |l_i^{(0)}\rangle + \lambda P_0 |l_i^{(1)}\rangle + \dots).$$

$P_1 |l_i^{(0)}\rangle = P_1 P_0 |l_i^{(0)}\rangle = 0$  に注意して、 $\lambda^2$  の係数を比較すれば、

$$v_i P_0 |l_1^{(0)}\rangle - P_0 VP_0 |l_i^{(1)}\rangle + \Delta_i^{(2)} P_0 |l_i^{(0)}\rangle = P_0 VP_1 |l_i^{(1)}\rangle.$$

(5.2.6) を代入して、

$$= P_0 \sum_{k \notin D} \frac{V |k\rangle \langle k| V |l_i^{(0)}\rangle}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

$\langle l_j^{(0)} |$  をかけて、

$$v_i \langle l_j^{(0)} | P_0 |l_i^{(1)}\rangle - \langle l_j^{(0)} | P_0 VP_0 |l_i^{(1)}\rangle + \Delta_i^{(2)} \langle l_j^{(0)} | P_0 |l_i^{(0)}\rangle = \sum_{k \notin D} \frac{\langle l_j^{(0)} | V |k\rangle \langle k| V |l_i^{(0)}\rangle}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

少し変形して

$$(v_i - v_j) \langle l_j^{(0)} | P_0 | l_i^{(1)} \rangle + \Delta_i^{(2)} \delta_{ij} = \sum_{k \notin D} \frac{\langle l_j^{(0)} | V | k \rangle \langle k | V | l_i^{(0)} \rangle}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

$i = j$  なら

$$\Delta_i^{(2)} = \sum_{k \notin D} \frac{|\langle k | V | l_i^{(0)} \rangle|^2}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

$i \neq j$  なら左から  $|l_j^{(0)}\rangle$  をかけて,

$$|l_j^{(0)}\rangle \langle l_j^{(0)} | P_0 | l_i^{(1)} \rangle = |l_j^{(0)}\rangle \frac{1}{v_i - v_j} \sum_{k \notin D} \frac{\langle l_j^{(0)} | V | k \rangle \langle k | V | l_i^{(0)} \rangle}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

$j \neq i$  で和を取って,

$$\sum_{j \neq i} |l_j^{(0)}\rangle \frac{1}{v_i - v_j} \sum_{k \notin D} \frac{\langle l_j^{(0)} | V | k \rangle \langle k | V | l_i^{(0)} \rangle}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}} = \sum_{j \neq i} |l_j^{(0)}\rangle \langle l_j^{(0)} | P_0 | l_i^{(1)} \rangle.$$

$|l_j^{(0)}\rangle \langle l_j^{(0)} | P_0 | l_i^{(1)} \rangle = |l_j^{(0)}\rangle \langle l_j^{(0)} | l_i^{(1)} \rangle$  で,  $i = j$  ならば  $\langle l_j^{(0)} | l_i^{(1)} \rangle = 0$  なので,

$$\sum_{j \neq i} |l_j^{(0)}\rangle \langle l_j^{(0)} | P_0 | l_i^{(1)} \rangle = \sum_j |l_j^{(0)}\rangle \langle l_j^{(0)} | P_0 | l_i^{(1)} \rangle = P_0 |l_i^{(1)}\rangle.$$

( $\{|l_j^{(0)}\rangle\}$  が完全系をなすのは縮退部分空間  $D$  において, あることに注意) 以上から,

$$P_0 |l_i^{(1)}\rangle = \sum_{j \neq i} |l_j^{(0)}\rangle \frac{1}{v_i - v_j} \sum_{k \notin D} \frac{\langle l_j^{(0)} | V | k \rangle \langle k | V | l_i^{(0)} \rangle}{E_D^{(0)} - E_k^{(0)}}.$$

■(5.3.45) (3.8.63)

■(5.3.50) (3.8.39), (3.8.65)

■(5.6.43) (2.6.38), (2.6.40), (2.7.68)

## Chapter6

# Scattering Theory

■(6.3.3) (6.2.14)

■(6.3.17) (6.2.3), (6.2.14)

■(6.4.14) (6.2.23) と

$$\int_{-1}^1 P_l(x) P_{l'}(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}.$$

■(6.4.17) (6.4.41)

■(6.5.7) (6.2.14) と  $\mathbf{k}$  が  $+\hat{z}$  の向きであることに注意.

■(6.5.19) (6.4.41)

■(6.6.9) (6.4.55)

■(6.6.31) (6.6.13)

■(6.9.6) (6.1.19) を  $\rho(E_n) = mk'/\hbar^2(L/2\pi)^3 d\Omega$ , (6.1.20) を  $w(i \rightarrow n) = mk'L^3/(2\pi)^2\hbar^3|T_{ni}|^2 d\Omega$  として (6.1.22) が<sup>3</sup>

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{k'}{k} \left( \frac{mL^3}{2\pi\hbar^2} \right)^3 |\langle \mathbf{k}', n | T | \mathbf{k}, 0 \rangle|^2.$$

さらに Born 近似  $T = V$  とする.

## Chapter7

### Identical Particles

■(7.3.9) (3.8.12)(3.8.15) から  $(S_1 + S_2)^2 = \mathbf{S}^2$  の固有値は triplet が  $2\hbar^2$ ; singlet が  $0$ .  $S_1 \cdot S_2 = (\mathbf{S}^2 - S_1^2 - S_2^2)/2$  なので、従う。

■(7.6.16) 磁場の計算：

$$\begin{aligned}\mathbf{B} &= \nabla \times \mathbf{A}(x, t) = \nabla \times \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda} \mathbf{A}_{\mathbf{k}, \lambda}(x, t) \\ &= \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \nabla \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda} \left[ \mathbf{A}_{\mathbf{k}, \lambda} e^{-i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} + \mathbf{A}_{\mathbf{k}, \lambda}^* e^{i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} \right] \\ &= \sum_{\mathbf{k}, \lambda} i \mathbf{k} \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda} \mathbf{A}_{\mathbf{k}, \lambda} e^{-i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} - \sum_{\mathbf{k}, \lambda} i \mathbf{k} \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda} \mathbf{A}_{\mathbf{k}, \lambda}^* e^{i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} \\ &= i \sum_{\mathbf{k}, \lambda} \left[ \mathbf{A}_{\mathbf{k}, \lambda} e^{-i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} - \mathbf{A}_{\mathbf{k}, \lambda}^* e^{i(\omega_k t - \mathbf{k} \cdot \mathbf{x})} \right] (\mathbf{k} \times \hat{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}, \lambda}).\end{aligned}$$